eurofarma

# ACF® Grip

Paracetamol + Clorfeniramina maleato + Cafeína

Antigripal

**Composición**
Cada comprimido recubierto de **ACF® Grip** contiene:
Paracetamol 500 mg; Clorfeniramina maleato 4 mg; Cafeína 50 mg; excipientes* c.s.
*Excipientes: almidón de maíz, povidona, ácido esteárico, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, sacarina, dióxido de titanio, talco, polietilenglicol, lecitina de soja, polivinil alcohol, aroma naranja, amarillo quinoleína y amarillo ocaso

**Acción terapéutica**
**ACF® Grip** combina en su fórmula los elementos necesarios para combatir en forma racional, eficiente y segura los síntomas asociados a la gripe y el resfriado común, así como a otros cuadros inflamatorios del aparato respiratorio superior que cursen con fiebre, dolor leve o moderado de cabeza, lagrimeo y estornudos.
El paracetamol es un fármaco ampliamente conocido, con probada eficacia analgésica y antipirética. Baja la fiebre y alivia la cefalea, dolores articulares y musculares típicos de los cuadros gripales. La clorfeniramina es un antihistamínico H1 que contribuye a mejorar la obstrucción nasal disminuyendo la hipercrinia mucosa, la inflamación y la irritación a ese nivel.
La cafeína es una metil xantina con efecto estimulante sobre el sistema nervioso central lo que le confiere la propiedad de combatir el cansancio y el decaimiento, además potencia el efecto analgésico del paracetamol.
La fórmula multivalente que posee **ACF® Grip** alivia el malestar general causado por la infección gripal y contribuye a una más rápida recuperación.

**Indicaciones**
**ACF® Grip** está indicado para el alivio sintomático de las afecciones gripales que cursan con fiebre, dolor leve o moderado (como dolor de cabeza), resfrío y decaimiento.

**Dosis y administración**
Adultos y niños mayores de 14 años: 1 comprimidos cada 6-8 horas. No superar 6 comprimidos por día.
Pacientes mayores de 65 años deben consultar a su médico porque pueden necesitar dosis menores.
Pacientes con enfermedad hepática o renal, consultar a su médico.
Si la fiebre dura más de 3 días, los síntomas empeoran o no mejoran al cabo de 5 días, o aparecen otros síntomas, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

**Contraindicaciones**
• Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes
• Niños menores a 14 años
• Enfermedad hepática
• Enfermedad cardíaca grave
• Ansiedad (angorafobia, ataques de pánico)

**Precauciones y advertencias**
Pacientes alcohólicos crónicos no superar más de 4 comp./ día
Pacientes con arritmias cardíacas, hiperfunción tiroidea, síndromes ansiosos no deben tomar más de 2 comp./día.
Se deberá tener precaución y consultar a su médico en los siguientes casos:
• Pacientes asmáticos sensibles al ácido Acetil salicílico
• Pacientes con úlcera del estómago o intestino
• Pacientes sensibles a algún antihistamínico, con hipertensión arterial, con insomnio, diabetes, con anemia, enfermedades del corazón, del pulmón, del riñón, galucoma, hipertrofia prostática, obstrucción del cuello vesical, retención urinaria, ataques agudos de asma, úlceras del estómago o intestino.
Pacientes sensibles a medicamentos para tratar el asma como aminofilina, teofilina, pueden ser sensibles a la cafeína por lo que no deberán tomar este medicamento.
Evitar el uso concomitante con bebidas alcohólicas o fármacos barbitúricos o tranquilizantes.

**Embarazo y lactancia**
No se recomienda su empleo durante el embarazo y la lactancia.

**Posibles efectos adversos**
Bien tolerado a dosis usuales.
Efectos adversos debido al Paracetamol (puede

244761 Barcode 44761

afectar 1 de cada 1000 personas): trastornos del riñón; orina turbia; erupción cutánea; ictericia; alternaciones sanguíneas y bajada de azúcar en sangre. El paracetamol puede dañar el hígado en dosis altas o tratamientos prolongados.
Efectos adversos debido a la Clorfeniramina cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud: somnolencia y sedación; sequedad de boca y garganta (más probable en pacientes de edad avanzada); náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento (estos efectos se pueden evitar tomando el medicamento con leche o comida); erupciones cutáneas.
Con frecuencia rara (puede afectar 1 de cada 1000 personas): visión borrosa; confusión; retención urinaria, dificultad o dolor durante la micción (sobre todo en pacientes de edad avanzada); pérdida de apetito.
Puede presentarse también un efecto paradójico de excitación, nerviosismo, pesadillas, que se ha observado con más frecuencia en niños y pacientes de edad avanzada; alteraciones sanguíneas, aumento de la sudoración, taquicardias.
Efectos adversos debido a la Cafeína cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud: nerviosismo, desasosiego, irritación de estómago o intestino, taquicardias.

**Interacciones**
Existen interacciones beneficiosas entre los componentes de **ACF® Grip**, la cafeína contrarresta la somnolencia producida por la clorfeniramina y potencia el efecto analgésico del paracetamol.
Interacciones con otros medicamentos:
Disulfiram; Simpaticomiméticos; Mexiletina; medicamentos o bebidas con cafeína u otros medicamentos que estimulan el SN; Cimetidina; Medicamentos para tratar el asma; Antidepresivos tricíclicos, maprotilina, litio; IMAO usados en la depresión o Parkinson; Procarbazina usada en el tratamiento de cáncer; Hierro; Eritromicina; Antihistamínicos.
No debe usar este medicamento con otros analgésicos sin consultar a su médico.
Si está usando alguno de estos medicamentos puede ser necesario modificar la dosis de alguno de ellos o interrumpir el tratamiento: Antibióticos (cloranfenicol); Anticoagulantes orales (acenocumarol, warfarina); Anticonceptivos orales y tratamientos con estrógenos; Antiepilépticos (lamotrigina, fenitoína u otras hidatoínas, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona, carbamazepina); Antituberculosos (isoniazida, rifampinica); Barbitúricos; Carbón activado; Colestiramina; Medicamentos usados para el tratamiento de la gota; Diuréticos del asa; Anticolinérgicos como glicopirronio, propantelina; Metoclopramida y domperidona; Propanolol; Zidovudina.
Puede interferir en los resultados del análisis de ácido úrico en sangre y con las pruebas cutáneas que utilizan alérgenos. Se recomienda suspender la toma de este medicamento al menos tres días antes de comenzar con los análisis e informar a su médico.
La administración conjunta con potentes inductores enzimáticos (rifampicina, determinados anticonvulsivantes, etc) puede conducir a reacciones de hepatotoxicicdad, especialmente cuando se emplean dosis elevadas de paracetamol.
Uso con alimentos, bebidas y alcohol
Puede producir daño hepático en personas que consumen habitualmente alcohol.El uso simultáneo de este medicamento con bebidas que contienen cafeína puede ocasionar nerviosismo, irritabilidad e insomnio. El uso simultáneo de este medicamento con bebidas alcohólicas, puede producir una interacción con la clorfeniramina, potenciándose los efectos sedantes.

**Presentaciones**
**ACF® Grip** - estuche conteniendo 8 comprimidos recubiertos.

**Condiciones de conservación**
Conservar a temperatura ambiente (15ºC - 30ºC).

NO UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (C.I.A.T.) Tel.: 1722

eurofarma

**Elaborado por Eurofarma Argentina S.A.**
**para Eurofarma Uruguay S.A.**
**Democracia 2132**
**Tel.: 2401 5454 - Fax: 2402 0808.**
**Montevideo - Uruguay**
**www.eurofarma.com.uy**

244761 Barcode 44761