

# Sildenafil 50mg Eurofarma

## COMPRESIDO RECUBIERTO

### FORMA FARMACÉUTICA Y PRESENTACIONES

Envases de 2 o 4 comprimidos recubiertos que contienen 50 mg de sildenafil.

#### USO ORAL

#### USO ADULTO

#### COMPOSICIÓN

Cada comprimido recubierto contiene:  
 sildenafil (bajo forma de citrato) \* ..... 70,24 mg  
 excipientes \*\* c.s.p. .... 1 comprimido  
 \* Cada 1,4048 mg de citrato de sildenafil equivalen a 1,00 mg de sildenafil base.  
 \*\* Excipientes: celulosa microcristalina, dióxido de silicio, croscarmelosa sódica, fosfato de calcio dibásico, estearato de magnesio, hipromelosa, triacetina, dióxido de titanio, sicovit laca indigotina.

#### 1. Qué es Sildenafil 50 mg Eurofarma y para qué se utiliza

Sildenafil 50 mg Eurofarma pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Actúa dilatando los vasos sanguíneos del pene, permitiendo la afluencia de sangre cuando se está sexualmente estimulado. Sildenafil 50 mg Eurofarma sólo le ayudará a conseguir una erección si se encuentra sexualmente estimulado. No debe tomar Sildenafil 50 mg Eurofarma si no tiene disfunción eréctil. El uso de Sildenafil 50 mg Eurofarma no está indicado en mujeres. Sildenafil 50 mg Eurofarma está indicado en el tratamiento de la disfunción eréctil masculina, a veces denominada impotencia. Esto sucede cuando un varón no puede obtener o mantener una erección firme, adecuada para una actividad sexual satisfactoria.

#### 2. Antes de tomar Sildenafil 50 mg Eurofarma

- **No tome Sildenafil 50 mg Eurofarma**
- Si es alérgico (hipersensible) a sildenafil o a cualquiera de los demás componentes de Sildenafil 50 mg Eurofarma.
- Si está tomando medicamentos llamados nitratos, ya que la combinación puede causar una disminución de su presión sanguínea potencialmente peligrosa. Consulte a su médico

si está tomando cualquiera de estos medicamentos, que a menudo, se administran para aliviar el dolor de angina de pecho (o “dolor de pecho”). Si no está seguro, consulte con su médico.

- si está tomando riociguat. Este medicamento se utiliza para tratar la hipertensión arterial pulmonar (es decir, tensión alta en los pulmones) y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (es decir, tensión alta en los pulmones provocada por coágulos). Los inhibidores de la PDE5, como Sildenafil 50 mg Eurofarma, han mostrado que producen un incremento del efecto hipotensivo de este medicamento. Si está tomando riociguat o no está seguro consulte a su médico,
- Si está utilizando cualquiera de los medicamentos denominados dadores de óxido nítrico tales como nitrato de amilo (“poppers”), ya que la combinación puede causar una disminución de su presión sanguínea potencialmente peligrosa.
- Si tiene un problema grave de corazón o hígado.
- Si ha padecido recientemente un accidente isquémico cerebral, infarto cerebral o ataque al corazón, o si tiene la tensión arterial baja.
- Si padece una rara enfermedad ocular hereditaria (tal como retinitis pigmentosa).
- Si ha experimentado anteriormente una pérdida de la visión debido a una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIA-NA) (enfermedad del nervio óptico).

#### • Tenga especial cuidado con Sildenafil 50 mg Eurofarma

Informe a su médico si:

- tiene una enfermedad debida a un bloqueo o estrechamiento de una vena en los pulmones en lugar de un bloqueo o estrechamiento de una arteria,
- tiene un problema grave de corazón,
- tiene un problema con las cámaras de bombeo del corazón,
- tiene una tensión sanguínea elevada en los vasos sanguíneos de los pulmones,
- tiene baja tensión sanguínea en descanso,
- pierde una gran cantidad de fluidos corporales (deshidratación) que se puede producir cuando suda mucho o no bebe suficientes líquidos. Esto puede suceder si está enfermo con fiebre, vómitos o diarrea,
- padece una rara enfermedad ocular hereditaria (retinitis pigmentaria),
- padece una alteración de los glóbulos rojos (anemia falciforme), cáncer de las células sanguíneas (leucemia), cáncer de médula ósea (mieloma múltiple) o cualquier enfermedad o deformidad del pene,
- padece actualmente úlcera de estómago o alteraciones hemorrágicas (tales como hemofilia) o sangrado de nariz,
- usa medicamentos para la disfunción eréctil.

Cuando se utilizan inhibidores PDE5, incluyendo sildenafil, para tratar la disfunción eréctil (DE), se han notificado los siguientes efectos adversos visuales con frecuencia no conocida: disminución o pérdida parcial, repentina, temporal o permanente de la visión de uno o ambos ojos. Si experimenta una reducción o pérdida repentina de la visión, deje de tomar este medicamento y consulte inmediatamente con su médico. Se han observado erecciones prolongadas y a veces dolorosas en hombres que tomaban sildenafil. Si tiene una erección que se prolongue durante más de 4 horas, deje de tomar este medicamento y consulte inmediatamente con su médico.

- Uso en niños y adolescentes

El uso de Sildenafil 50 mg Eurofarma no está indicado en personas menores de 18 años.

- Uso en pacientes con alteraciones renales o problemas hepáticos

Debe comunicar a su médico si tiene problemas renales o hepáticos. Su médico puede decidir reducirle la dosis.

- Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta. Los comprimidos de Sildenafil 50 mg Eurofarma pueden interferir con algunos medicamentos, especialmente los utilizados para tratar el dolor de pecho. En caso de urgencia médica, debe informar a cualquier profesional sanitario que está tomando Sildenafil 50 mg Eurofarma y cuando lo tomó. No debe tomar Sildenafil 50 mg Eurofarma con otros medicamentos a menos que su médico se lo aconseje. No debe tomar Sildenafil 50 mg Eurofarma si está tomando medicamentos denominados nitratos, ya que la combinación de estos productos puede causar un descenso potencialmente peligroso de su presión sanguínea. Siempre informe a su médico si está tomando cualquiera de estos medicamentos, que a menudo, se utilizan para aliviar el dolor de angina de pecho (o “dolor de pecho”).

No debe tomar Sildenafil 50 mg Eurofarma si está tomando medicamentos denominados dadores de óxido nítrico tales como nitrato de amilo (“poppers”), ya que la combinación de estos también puede dar lugar a un descenso de su presión sanguínea potencialmente peligroso. Si está tomando medicamentos conocidos como inhibidores de la proteasa, como los utilizados en el tratamiento del VIH, su médico puede recomendarle que comience el tratamiento con la dosis más baja (25 mg) de sildenafil. Algunos pacientes que están recibiendo un alfabloqueante, medicamento utilizado para el tratamiento de la presión arterial alta o de la hipertrofia prostática, pueden experimentar mareos o sensación de vahído que pueden ser causados por una disminución de la tensión arterial al sentarse o levantarse rápidamente. Algunos pacientes han experimentado estos síntomas al tomar sildenafil con alfabloqueantes. Esto es más probable que ocurra en las 4 horas siguientes a la toma de sildenafil. Con el fin de disminuir la probabilidad de que ocurran estos síntomas, deberá estar recibiendo su dosis diaria de alfabloqueantes de forma regular antes de comenzar con Sildenafil. Su médico puede indicarle que comience el tratamiento con la dosis inferior (25 mg) de Sildenafil.

#### • Toma de Sildenafil 50 mg Eurofarma con los alimentos y bebidas

Sildenafil 50 mg Eurofarma puede tomarse con o sin alimentos. Sin embargo, puede notar que Sildenafil 50 mg Eurofarma tarde un poco más en hacer efecto si se ingiere con una comida copiosa.

La ingesta de alcohol puede dificultar, temporalmente, la capacidad para obtener una erección.

Por lo tanto, para conseguir el máximo beneficio del medicamento, se aconseja no ingerir grandes cantidades de alcohol antes de tomar Sildenafil 50 mg Eurofarma.

- Embarazo y lactancia

El uso de Sildenafil 50 mg Eurofarma no está indicado en mujeres.

- Conducción y uso de máquinas

Sildenafil 50 mg Eurofarma puede producir mareos y afectar a la visión. Debe saber

cómo reacciona usted a Sildenafil 50 mg Eurofarma antes de conducir vehículos o utilizar maquinaria.

#### 3. Cómo tomar Sildenafil 50 mg Eurofarma

Siga exactamente las instrucciones de administración de Sildenafil indicadas por su médico. Consulte a su médico si tiene dudas. La dosis normal de inicio es 50 mg.

#### *No se debe tomar Sildenafil 50 mg Eurofarma más de una vez al día.*

Debe tomar Sildenafil aproximadamente una hora antes de que planea tener relaciones sexuales.

Trague el comprimido entero con un vaso de agua.

Si estima que la acción de Sildenafil es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico.

Sildenafil sólo le ayudará a conseguir una erección si se encuentra sexualmente estimulado. El tiempo que necesita Sildenafil para hacer efecto varía de una persona a otra, generalmente oscila entre media hora y una hora. El efecto de Sildenafil puede retrasarse si lo toma con una comida copiosa.

En el caso de que Sildenafil no le ayude a conseguir una erección o si la erección no se mantiene el tiempo suficiente para completar el acto sexual, consulte a su médico.

#### • Si toma más Sildenafil 50 mg Eurofarma del que debiera

Puede experimentar un incremento de los efectos secundarios y su gravedad. Dosis superiores a 100 mg no aumentan la eficacia.

#### *No debe tomar más comprimidos de los recomendados por el médico.*

Contacte con su médico si ha tomado más comprimidos de los aconsejados.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico.

#### 4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, Sildenafil 50 mg Eurofarma puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Los efectos adversos notificados asociados al uso de sildenafil son por lo general de intensidad leve a moderada y de corta duración.

Si usted sufre dolores de pecho durante o después de mantener relaciones sexuales:

- Sitúese en una posición semisentado e intente relajarse

- **No use nitratos** para tratar su dolor en el pecho

- Contacte con su médico inmediatamente

Todos los medicamentos incluyendo Sildenafil 50 mg Eurofarma pueden causar reacciones alérgicas. Debería contactar con su médico inmediatamente si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas después de tomar sildenafil: silbido repentino al respirar, dificultad para respirar o mareos, hinchazón de los párpados, cara, labios o garganta.

Se han notificado casos de erecciones prolongadas y a veces dolorosas después de tomar sildenafil. Si usted tiene una erección que dura más de 4 horas, debe contactar con su médico inmediatamente. Si experimenta una disminución o pérdida repentina de la visión, deje de tomar sildenafil y contacte con su médico inmediatamente.

**El efecto adverso más frecuente** (en 1 de cada 10 pacientes) es el dolor de cabeza.

**Los efectos adversos frecuentes** (entre 1 y 10 de cada 100 pacientes) incluyen: enroje-

cimiento facial, indigestión, efectos sobre la visión (incluyendo percepción anormal del color, sensibilidad a la luz o visión borrosa o disminución de la agudeza visual), congestión nasal y mareos.

**Efectos adversos poco frecuentes** (entre 1 y 10 de cada 1000 pacientes) incluyen: vómitos, erupciones cutáneas, sangrado en la parte posterior del ojo, irritación ocular, derrame ocular/ojos rojos, dolor ocular, visión doble, sensación anormal en el ojo, ojo lloroso, sangrado del pene, presencia de sangre en el semen y/o en la orina, latido cardíaco irregular o rápido, dolor muscular, sensación de somnolencia, sensación al tacto reducido, vértigo, pitidos en los oídos, náuseas, boca seca, dolor en el pecho y sensación de cansancio.

**Efectos adversos raros** (entre 1 y 10 de cada 10000 pacientes) incluyen: presión arterial alta, presión arterial baja, desvanecimiento, accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, sangrado de la nariz y disminución o pérdida repentina de la audición.

Los efectos adversos notificados de la experiencia postcomercialización incluyen: palpitaciones, dolor de pecho, muerte súbita disminución transitoria del flujo sanguíneo a algunas partes del cerebro. La mayoría, pero no todos ellos, tenían problemas cardíacos antes de tomar este medicamento. No es posible determinar 5 de 6

si estos acontecimientos estuvieron relacionados directamente con Sildenafil 50 mg Eurofarma. También se han notificado casos de convulsiones o crisis y reacciones graves de la piel que cursan con erupción, ampollas, descamación de la piel y dolor que requiere asistencia médica inmediata.

#### Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de los efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del sistema de farmacovigilancia del MS: https://www.gub.uy/tramites/notificacion-reacciones-adversas-medicamentos.

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

#### 5. Conservación de Sildenafil 50 mg Eurofarma

Conservar a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C). Proteger de la luz y la humedad.

#### Número de lote y fechas de fabricación y validez: véa el envase.

**No utilice el medicamento con la fecha de caducidad vencida. Guárdelo en su empaque original.**

Características del producto: comprimido pentagonal recubierto, biconvexo azul. NO UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO FUERA DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS **Centro de atención y asesoramiento toxicológico (C.I.A.T.) - 1722**

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.  
 Rod. Pres. Castello Branco, Km 35,6 - Nº: 3565 - Itapevi – SP- Brasil

**Representante:** Eurofarma Uruguay S.A.  
 Democracia 2132 Tel. 2401 5454 / Fax: 2402 0808  
 Montevideo - Uruguay  
 www.eurofarma.com.uy



PARA PARAGUAY

# Sildenafil 50mg

## Eurofarma

COMPRIMIDO RECUBIERTO

FORMA FARMACÉUTICA Y PRESENTACIONES

Estuche con 1, 2 o 4 comprimidos recubiertos conteniendo 50 mg de sildenafil.

USO ADULTO  
VIA ORAL

### COMPOSICIÓN

Cada comprimido recubierto contiene:

Sildenafil	50mg*
equivalente a 70,24mg de citrato de sildenafil	
excipientes** c.s.p.	1 comprimido

\*\*Excipientes: celulosa microcristalina, dióxido de silicio, croscarmelosa sódica, fosfato de calcio dibásico, estearato de magnesio, hipromelosa, triacetín, dióxido de titanio, sicovit laca indigotina.

### INFORMACIONES AL PACIENTE

#### 1. ¿PARA QUÉ ES INDICADO ESTE MEDICAMENTO?

Sildenafil 50 mg, está indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil, que se entiende como, siendo la incapacidad de obtener o mantener una erección (rigidez del pene) suficiente para un desempeño sexual satisfactorio.

#### 2. ¿CÓMO FUNCIONA ESTE MEDICAMENTO?

Sildenafil 50 mg, actúa favoreciendo la relajación de la musculatura lisa de los cuerpos cavernosos (principal estructura eréctil del pene) y la dilatación de las arterias que llevan la sangre hasta ellos, facilitando la entrada de sangre en el pene y consecuentemente, favoreciendo la erección. Para que Sildenafil 50 mg sea eficaz, es necesario estímulo sexual.

#### 3. ¿CUÁNDO NO DEBO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento es contraindicado para uso por pacientes en tratamiento con medicamentos que contengan cualquier forma donadora de óxido nítrico, nitratos orgánicos o nitritos orgánicos.

La coadministración de inhibidores de la PDE5, incluyendo citrato de sildenafil, con estimuladores de la guanilato ciclasa, tales como riociguat, está contraindicada, una vez que puede potencialmente llevar a la hipotensión sintomática.

En caso de duda, si el medicamento que se encuentra usando es un medicamento que contenga esas sustancias, consulte a su médico o farmacéutico.

Tampoco debe usar Sildenafil 50 mg, si se tiene hipersensibilidad (reacción alérgica) conocida al citrato de sildenafil o a cualquier componente de la fórmula.

Este medicamento está contraindicado para uso por mujeres.

Este medicamento está contraindicado para menores de 18 años.

#### 4. ¿QUÉ DEBO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

La actividad sexual aumenta la exigencia del corazón pudiendo aumentar el riesgo de ataques cardíacos durante el acto sexual, por eso los médicos pueden solicitar una evaluación de la condición cardiovascular (del corazón y de los vasos sanguíneos) antes del uso de Sildenafil 50 mg, si tiene motivos médicos que desaconsejen la actividad sexual, el uso de Sildenafil 50 mg, es desaconsejado. Si ya presentó alguna forma de Neuropatía Óptica Isquémica no arterítica (lesión del nervio óptico por reducción de la cantidad de sangre) o retinitis pigmentosa hereditaria (enfermedad de la retina, región del ojo donde se forma la imagen) el uso de Sildenafil 50 mg, debe ser discutido cuidadosamente con su médico porque este medicamento puede aumentar el riesgo de este tipo de situación.

Sildenafil 50 mg, debe ser usado con cautela en portadores de: (1) deformaciones anatómicas del pene (tales como angulación, fibrosis cavernosa o enfermedad de Peyronie), (2) condiciones que puedan predisponerlos al priapismo (erección persistente y dolorosa del pene), tales como anemia falciforme (enfermedad hereditaria de las células rojas de la sangre), mieloma múltiplo o leucemia (tipos de cáncer de la sangre) y (3) disturbios hemorrágicos (sangrados) o con úlcera péptica activa (herida en el estómago y/o en la parte inicial del intestino). En caso de que note disminución o pérdida repentina de la audición y/o visión interrumpa inmediatamente el uso de Sildenafil 50 mg y consulte su médico. Siempre avise a su médico todas las medicaciones que toma cuando le van a prescribir una medicación nueva. El médico necesita evaluar si las medicaciones reaccionan entre sí alterando su opción, o de la otra; eso se llama interacción medicamentosa. Los siguientes medicamentos pueden interferir en el clearance (aumentar o disminuir la eliminación) de Sildenafil 50 mg: inhibidores o inductores del citocromo P450 3A4 y 2C9 (enzimas del hígado), tales como el ketoconazol, itraconazol (antifúngicos), eritromicina (antibiótico)

o cimetidina; diuréticos (tipo de medicamento para inducir excreción de agua por la orina) de aumento y ahorradores de potasio, beta bloqueadores no específicos (medicamentos que controlan el ritmo del corazón) y medicamentos para el tratamiento del VIH (saquinavir, ritonavir). Mientras se encuentre utilizando Sildenafil 50 mg, no tome otros tratamientos para hipertensión arterial pulmonar (presión alta en los pulmones) que contengan sildenafil u otros tratamientos para disfunción eréctil.

Sildenafil 50 mg, puede aumentar el efecto hipotensor (reducción de la presión sanguínea) de los nitratos, por eso, el uso con esos medicamentos está contraindicado. El uso simultáneo al de la doxazosina (medicamento para hiperplasia - aumento – prostática benigna) y de otros medicamentos de su clase terapéutica ( $\alpha$ -bloqueadores) puede llevar a la reducción de la presión sanguínea cuando el individuo está en la posición supina (acostado panza arriba) y/o hipotensión postural sintomática (disminución de la presión arterial al levantarse).

En caso de persistencia de erección por más de cuatro horas, busque atención médica inmediatamente.

Consulte a su médico o farmacéutico caso tenga dudas y utilice alguno de estos medicamentos.

No interactúa con el ácido acetil salicílico (150 mg), alcohol (hasta 80 mg/dL de alcohol en la sangre) y medicación antihipertensiva (medicación para tratar presión alta).

Informe a su médico o cirujano dentista si está haciendo uso de algún otro medicamento.

No use medicamento sin el conocimiento de su médico. Puede ser peligroso para su salud.

#### 5. ¿DÓNDE, CÓMO Y POR CUÁNTO TIEMPO PUEDO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar en temperatura ambiente (entre 15 y 30°C). Proteger de la luz y humedad.

Número de lote y fechas de fabricación y validez: vea embalaje.

No use medicamento con el plazo de validez vencido. Guárdelo en su embalaje original.

Antes de usar, observe el aspecto del medicamento.

Caso se encuentre en el plazo de validez y observe algún cambio en el aspecto, consulte al farmacéutico para saber si podrá utilizarlo.

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.

Características del producto: comprimido pentagonal recubierto, biconvexo azul.

#### 6. ¿CÓMO DEBO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Debe tomar Sildenafil 50 mg, por vía oral (por la boca).

Uso en Adultos: 50 mg en dosis única, administrada cuando sea necesario y

aproximadamente 1 hora antes de la relación sexual.

De acuerdo con la eficacia y tolerabilidad, la dosis puede ser aumentada para una dosis máxima recomendada de 100 mg o disminuida para 25 mg.

La dosis máxima recomendada es de 100 mg. La frecuencia máxima recomendada de Sildenafil 50 mg, es de 1 vez al día.

Usuarios de ritonavir: dosis única máxima de 25 mg de Sildenafil 50 mg, dentro de un periodo de 48 horas.

Portadores de insuficiencia renal grave (reducción de la función de los riñones), insuficiencia hepática (reducción de la función hepática) o usuarios de los inhibidores de la CYP3A4 (ver pregunta 4): considerar dosis inicial de 25 mg de sildenafil, aumentando si fuere necesario.

Siga la orientación de su médico, respetando siempre los horarios, las dosis y la duración del tratamiento.

No interrumpa el tratamiento sin el conocimiento de su médico.

Este medicamento no debe ser partido, abierto o masticado.

#### 7. ¿QUÉ DEBO HACER CUÁNDO OLVIDO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Sildenafil 50 mg, es un medicamento de uso bajo demanda (uso conforme sea necesario). Caso olvide usar este medicamento, tómelo ni bien lo recuerde, caso quiera que el medicamento tenga su efecto esperado.

En caso de dudas, busque orientación del farmacéutico o de su médico o cirujano dentista.

#### 8. ¿CUÁLES SON LOS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO ME PUEDE CAUSAR?

**Reacción Muy Común** (ocurre en más de 10% de los pacientes que utilizan este medicamento): cefalea (dolor de cabeza).

**Reacción Común** (ocurre entre 1% y 10% de los pacientes que utilizan este medicamento): mareo, visión borrosa, disturbios visuales, cianopsia (cuando se ve todo de color azul), ondas de calor, rubor (enrojecimiento), congestión nasal, dispepsia (mala digestión) y náusea (mareo).

**Reacción No común** (ocurre entre 0,1% y 1% de los pacientes que utilizan este medicamento): rinitis (inflamación de la mucosa nasal), hipersensibilidad (reacción alérgica), somnolencia, dolor en el ojo, fotofobia (intolerancia a la luz), fotopsia (sensación de ver luces o colores brillantes), cromatopsia (objetos coloridos son percibidos en colores diferentes al original), hiperemia ocular (ojos enrojecidos)

ofuscamiento visual, taquicardia (aceleración de los latidos cardíacos), palpitación, hipotensión (presión baja), epistaxis (sangrado nasal), congestión de los senos nasales, enfermedad del reflujo gastroesofágico (contenido del estómago que vuelve para el esófago), vómito, dolor en el abdomen, boca seca, erupción cutánea (enrojecimiento de la piel), mialgia (dolor muscular) dolor en las extremidades, sensación de calor y aumento de la frecuencia cardíaca.

**Reacción Rara** (ocurre entre 0,01% y 0,1% de los pacientes que utilizan este medicamento): convulsión (ataque epiléptico), convulsión recurrente, síncope (desmayo), edema en el ojo, hinchazón en el ojo, ojos secos, astenopia (cansancio visual), visión de halo (aro brillante alrededor de luces brillantes), xantopsia (ver color amarillo en todos los objetos), eritropsia (ver color rojo en todos los objetos), disturbio de los ojos, hiperemia de la conjuntiva (parte blanca del ojo enrojecida), irritación de los ojos, sensación anormal de los ojos, edema en el párpado (hinchazón del párpado), cierre de la garganta, sequedad nasal (nariz seco), edema nasal (hinchazón de la nariz), hipoestesia oral (disminución de la sensibilidad de la boca), priapismo (erección persistente y dolorosa del pene), aumento de la erección e irritabilidad.

Informe a su médico, cirujano dentista o farmacéutico sobre la aparición de reacciones indeseables por el uso del medicamento.

#### 9. ¿QUÉ HACER SI ALGUIEN USA UNA CANTIDAD MAYOR QUE LA INDICADA DE ESTE MEDICAMENTO?

En estudios realizados con voluntarios saludables utilizando dosis únicas de hasta 800 mg, los eventos adversos fueron semejantes a aquellos observados con dosis inferiores; no obstante la tasa de incidencia y gravedad fueron mayores.

En caso de uso de gran cantidad de este medicamento, busque rápidamente auxilio médico y lleve el embalaje o prospecto del medicamento, si posible.

### SOBREDOSIS

En caso de sobredosis recurrir al:

Hospital de Trauma Manuel Giagni

Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Telf.: 021-204.800 Asunción-Paraguay

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

**Fabricado por: EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.**

Rod. Pres. Castello Branco, Km 35,6 - Nº: 3565 - Itapevi – SP- Brasil

**Importado por: Eurofarma Paraguay S.A**

Aviadores del Chaco Nº2050. Edificio WTC. Torre 4. Piso 15. Telef. 021 3387421

Acondicionamiento primario y secundario, empaquetador y procedencia alternativa: Eurofarma Argentina S.A.

Av. San Martín. La tablada. Bs As. Argentina

**DISTRIBUYE: La Policlínica**

Tte. Rojas Silva 1043 esq. Manuel O. Guerrero - Telf: 021 - 2480000

DT: Q.F. Angela Romero - Reg. Nº 4.756.

